

کتابخانه‌ی اگزوتیک — راهنمای نگهداری

راهنمای نگهداری اکلکتوس

طوطی‌ای که نر و ماده‌اش دو رنگ کاملاً متفاوت دارند — رژیم پرفیبر و غذای تازه، قفس و رطوبت، شخصیت نر و ماده، تخم‌گذاری و رفتار هورمونی، بیماری‌های مهم و نشانه‌های اورژانسی

دکتر مهدیار رمزگویان · دامپزشک حیوانات اگزوتیک

عکس: اکلکتوس نر (*Eclectus roratus*) — H. Zell، Wikimedia Commons، مجوز CC BY-SA 3.0

۱. کارت اطلاعات سریع

نام فارسی / علمی	طوطی اکلکتوس (*Eclectus roratus*)؛ زیرگونه‌ها یا «تیپ»های رایج در پرورش: سلیمان (Solomon Island، کوچک‌ترین)، گینه‌ی نو و قرمزپهلو (Red-sided)، واسماری (Vosmaeri، از بزرگ‌ترها) و گرند. برخی منابع جدید چند جمعیت را گونه‌ی جدا می‌دانند؛ رده‌بندی بسته به منبع متفاوت است.
ظاهر نر و ماده	**نر:** سبز درخشان با منقار بالایی نارنجی-قرمز تا زرد و پهلوهای قرمز زیر بال. **ماده:** قرمز با سینه یا گردن آبی-بنفش (بسته به زیرگونه) و منقار سیاه. جنسیت از حدود زمان پردرآوردن جوجه قابل تشخیص است.
طول عمر	با مراقبت خوب معمولاً ۳۰ سال یا بیشتر؛ عدد دقیق بسته به منبع متفاوت است
اندازه‌ی بالغ	حدود ۳۳ تا ۴۲ سانتی‌متر و حدود ۳۵۰ تا ۶۰۰ گرم، بسته به زیرگونه (سلیمان سبک‌تر، واسماری سنگین‌تر)
سطح دشواری	**متوسط تا بالا** — نیاز ویژه‌ی تغذیه‌ای (غذای تازه‌ی زیاد و حساسیت به مکمل‌ها)، نیاز به برنامه‌ی ثابت و آرامش، رفتار هورمونی ماده‌ها
رژیم	سهم بالای سبزیجات، میوه و جوانه‌ی تازه + پلت باکیفیت به‌عنوان بخشی از رژیم + دانه‌ی محدود؛ **بدون مکمل ویتامین خودسرانه**
دما / رطوبت	دمای معمولی خانه (حدود ۱۸ تا ۲۷ درجه) بدون کوران؛ بومی جنگل‌های مرطوب است، پس رطوبت متوسط تا نسبتاً بالا و حمام یا اسپری منظم مهم است (در هوای خشک، دستگاه بخور سرد کمک می‌کند)
نور و خواب	نور طبیعی روز یا لامپ تمام‌طیف مخصوص پرنده؛ ۱۰ تا ۱۲ ساعت خواب تاریک و آرام
اجتماعی / تنها	اجتماعی ولی معمولاً آرام‌تر و «تماشاگرتر» از کاکادو؛ به تعامل روزانه نیاز دارد اما اغلب به نوازش زیاد علاقه‌ای ندارد
صدا و حرف‌زدن	جیغ بلند در صبح و غروب؛ بسیاری از اکلکتوس‌ها کلمات را واضح تقلید می‌کنند (تضمینی نیست)
وضعیت قانونی	در پیوست II کنوانسیون CITES؛ فقط پرنده‌ی پرورش‌یافته در اسارت با مدارک معتبر

۲. مناسب چه کسی است؟ آیا اکلکتوس انتخاب درستی است؟

اکلکتوس پرنده‌ای باوقار، دقیق و حساس است. معمولاً مدتی فقط نگاه می‌کند، محیط را می‌سنجد و بعد اعتماد می‌کند. برخلاف تصور رایج، «طوطی بغلی» نیست و بیشتر از نوازش، از حضور شما، برنامه‌ی قابل‌پیش‌بینی، غذای تازه‌ی رنگارنگ و بازی‌های فکری لذت می‌برد. چالش اصلی نگهداری‌اش تغذیه است: بسیاری از مشکلاتی که در اکلکتوس می‌بینیم، از رژیمی شروع می‌شود که برای طوطی‌های دیگر قابل قبول است ولی برای این گونه نه.

انتخاب خوبی است اگر...

- حوصله و بودجه‌ی تهیه‌ی روزانه‌ی سبزی و میوه‌ی تازه و متنوع را دارید.
- خانه‌ای با برنامه‌ی نسبتاً منظم و آرام دارید.
- دنبال پرنده‌ای باهوش و همراه هستید، نه لزوماً پرنده‌ای که مدام بغل شود.
- برای چند دهه آینده برنامه دارید.

بهتر است صبر کنید اگر...

- می‌خواهید فقط با دانه یا فقط با پلت پرنده را تغذیه کنید.
- خانه پرتنش و پرسروصداست یا جابه‌جایی‌های مکرر دارید.
- صدای بلند صبح و غروب برای شما یا همسایه‌ها مشکل است.
- آماده‌ی مدیریت رفتار سرزمینی و هورمونی یک ماده‌ی بالغ نیستید.

نکته‌ی قانونی و اخلاقی

اکلکتوس در فهرست CITES است. پرنده‌ی صیدشده از طبیعت را نخرید: غیرقانونی است، معمولاً بیماری و استرس حمل‌ونقل دارد و اهلی نمی‌شود. پرنده را با پلاک بسته یا میکروچیپ و مدارک مبدأ از پرورش‌دهنده‌ی شناخته‌شده بگیرید و درباره‌ی مقررات فعلی از مراجع رسمی (مثل سازمان حفاظت محیط زیست) استعلام کنید.

۳. محل نگهداری و تجهیزات

مورد	توصیه	چرا؟
ابعاد قفس	حداقل حدود ۹۰ سانتی‌متر عرض، ۶۰ سانتی‌متر عمق و ۱۲۰ سانتی‌متر ارتفاع؛ بزرگ‌تر بهتر است. قفس عریض بر قفس باریک و بلند برتری دارد.	اکلکتوس بال‌های پهن و بدن نسبتاً سنگینی دارد و برای حرکت افقی و بازکردن بال به فضا نیاز دارد.
میله و جنس	فولاد با رنگ پودری مرغوب یا استیل؛ فاصله‌ی میله‌ها حدود ۲ تا ۲٫۵ سانتی‌متر؛ قفل مطمئن.	سیم گالوانیزه و رنگ پوسته‌شونده منبع روی و سرب‌اند.
نشیمن	چوب طبیعی بی‌خطر با قطرهای متفاوت؛ یک نشیمن پهن برای استراحت؛ حداکثر یک نشیمن زبر.	اکلکتوس وقت زیادی را آرام روی نشیمن می‌گذراند؛ تنوع قطر از زخم کف پا جلوگیری می‌کند.
اسباب‌بازی	چوب نرم برای جویدن، اسباب‌بازی جستجوی غذا، پازل، طناب کوتاه سیسال؛ هفتگی بچرخانید و اسباب‌بازی جدید را آرام معرفی کنید.	برخی اکلکتوس‌ها از اشیای جدید می‌ترسند؛ معرفی تدریجی (اول بیرون قفس، بعد کنار آن) استرس را کم می‌کند.
کف قفس	کاغذ ساده یا روزنامه‌ی بی‌رنگ زیر توری؛ تعویض روزانه.	رژیم پرآب و میوه‌ای مدفوع آبکی‌تری می‌دهد؛ دیدن روزانه‌ی مدفوع برای تشخیص تغییرات مهم است.
ظرف‌ها	استیل؛ چند ظرف جدا برای آب، غذای تازه و پلت؛ ظرف غذای تازه دور از زیر نشیمن.	غذای تازه سریع آلوده می‌شود؛ جداسازی و شستشوی روزانه از رشد باکتری و قارچ جلوگیری می‌کند.

- **جای قفس:** در اتاقی که خانواده هست ولی نه در مسیر رفت‌وآمد پرتنش؛ یک ضلع قفس به دیوار، دور از آشپزخانه، کولر و بخاری مستقیم و کوران. یک گوشه‌ی پوشیده یا نیمه‌پوشیده به احساس امنیت کمک می‌کند.
- **رطوبت و حمام:** اسپری آب ولرم یا ظرف حمام چند بار در هفته (بسیاری از اکلکتوس‌ها «حمام باران» را دوست دارند). پر خشک، شکننده و کدر می‌تواند نشانه‌ی هوای خشک یا مشکل تغذیه باشد.
- **نور و خواب:** نور طبیعی یا لامپ تمام‌طیف پرنده (شیشه بیشتر UVB را فیلتر می‌کند)؛ شب ۱۰ تا ۱۲ ساعت تاریکی و سکوت.

خطرهای پنهان خانه

بخار ظروف نچسب (تفلون/PTFE) در دمای بالا می‌تواند ظرف چند دقیقه پرنده را بکشد؛ همین‌طور دود سیگار و قلیان، اسپری‌ها، خوشبوکننده و شمع معطر. پنکه‌ی سقفی، پنجره و در باز، آینه، کابل برق، گیاهان سمی، سگ و گربه، و سرب و روی در وسایل قدیمی، کلید و زیورآلات خطرناک‌اند. زمان بیرون از قفس فقط با نظارت.

۴. تغذیه — مهم‌ترین بخش نگهداری اکلکتوس

اکلکتوس در طبیعت بیشتر از میوه، شکوفه، جوانه، دانه‌ی نارس و مواد گیاهی پرآب و پرفیبر تغذیه می‌کند. لوله‌ی گوارش آن نسبت به اندازه‌اش بلندتر از بسیاری از طوطی‌ها توصیف شده و تجربه‌ی بالینی نشان می‌دهد که این پرنده به رژیم‌های بسیار غنی‌شده و مکمل‌های مصنوعی حساس‌تر است. به همین دلیل، بسیاری از دامپزشکان پرندگان و پرورش‌دهندگان برای اکلکتوس رژیمی با **سهم بالای غذای تازه** و سهم کمتر پلت (نسبت به آمازون یا کاسکو) توصیه می‌کنند. نسبت دقیق را با دامپزشک خود تنظیم کنید.

جزء	سهم تقریبی	توضیح
سبزیجات تازه	بخش اصلی رژیم	سبزی برگ‌تیره، فلفل دلمه‌ای، هویج، کدو حلوایی، سیب‌زمینی شیرین پخته، بروکلی، لوبیا سبز، نخود فرنگی، ذرت تازه؛ منابع نارنجی و سبز تیره بتاکاروتن طبیعی می‌دهند.
میوه	بخش قابل‌توجه	انار، انبه، پاپایا، سیب و گلابی بدون هسته، انواع توت، انجیر؛ تنوع رنگ مهم است.
جوانه و حبوبات پخته	روزانه یا چند بار در هفته	جوانه‌ی تازه (با بهداشت کامل و بدون بو یا کپک)، عدس و نخود پخته‌ی بی‌نمک، برنج قهوه‌ای یا کینوا.
پلت فرموله‌شده	بخش کوچک‌تر (معمولاً حدود یک‌چهارم تا یک‌سوم، با نظر دامپزشک)	ترجیحاً پلت ساده، بدون رنگ و طعم مصنوعی و بدون شکر افزوده.
دانه و مغز	محدود، به‌عنوان پاداش	رژیم تخمه‌محور به کمبود ویتامین A، کلسیم و چاقی می‌انجامد. بادام‌زمینی و مغز کپک‌زده خطر آفلاتوکسین دارد.
آب	همیشه	آب تازه؛ ظرف را روزانه بشویید.

مکمل ویتامین و مواد معدنی: خودسرانه نه

در اکلکتوس‌ها افزودن قطره‌ی مولتی‌ویتامین به آب یا پودر مکمل روی غذا — به‌خصوص همراه با پلت غنی‌شده — می‌تواند به جای کمک، مشکل بسازد. رفتارهایی مثل **ضربه‌زدن یا لرزش تکراری انگشتان پا («toe tapping»)** و **تکان‌دادن ناگهانی بال‌ها («wing flipping»)** در اکلکتوس‌ها را بالینگران اغلب با مشکلات تغذیه‌ای و تغییرات رژیم مرتبط می‌دانند. اگر این نشانه‌ها را دیدید، رژیم را خودتان دستکاری نکنید و پرنده را برای بررسی به دامپزشک ببرید.

غذاهای ممنوع

آووکادو (همه‌ی اجزا)، شکلات و کاکائو، قهوه، چای و نوشابه‌ی کافئین‌دار، الکل، غذای شور، چرب و سرخ‌شده، پیاز و سیر، هسته‌ی زردآلو، گیلاس و هلو و دانه‌ی سیب، قارچ خام، زایلیتول، و هر غذای کپک‌زده یا مانده.

- **بهداشت غذای تازه:** سبزی و میوه را کاملاً بشویید؛ غذای تازه را بعد از چند ساعت (در هوای گرم زودتر) جمع کنید.
- **تغییر رژیم** را تدریجی و طی چند هفته با وزن‌کشی منظم انجام دهید؛ پرنده را برای پذیرفتن غذای جدید گرسنه نگه ندارید.
- **وزن:** هفته‌ای یک بار با ترازوی گرمی؛ تغییر پیوسته‌ی حدود ۱۰٪ دلیل مشورت با دامپزشک است.

۵. برنامه‌ی مراقبت

روزانه

- ☐ آب تازه و شستن ظرف‌ها
- ☐ تهیه‌ی غذای تازه‌ی متنوع؛ جمع‌کردن باقیمانده
- ☐ نگاه به مدفوع: رنگ، مقدار، شکل
- ☐ بررسی اشتها، حالت پر، انگشتان و بال‌ها
- ☐ زمان بیرون از قفس با نظارت
- ☐ جلسه‌ی کوتاه آموزش یا بازی فکری
- ☐ تعویض کاغذ کف قفس
- ☐ ۱۰ تا ۱۲ ساعت خواب تاریک

هفتگی

- ☐ وزن‌کشی و ثبت در دفترچه
- ☐ شستن نشیمن‌ها و توری کف
- ☐ چرخاندن اسباب‌بازی‌ها
- ☐ حمام یا اسپری چند بار در هفته
- ☐ بررسی پرها (خطوط استرس، پر جویده)، منقار، ناخن و کف پا
- ☐ بازبینی قفل، جوش‌ها و رنگ قفس

ماهانه و سالانه

- ☐ شستشوی کامل و ضدعفونی قفس و آبکشی کامل
- ☐ بررسی تاریخ و نگهداری پلت در ظرف دربسته
- ☐ تعویض لامپ تمام‌طیف طبق دستور سازنده
- ☐ معاینه‌ی سالانه‌ی دامپزشک پرندگان
- ☐ بازنگری رژیم و برنامه‌ی غنی‌سازی

۶. رفتار، آموزش و هندلینگ

اکلکتوس‌ها معمولاً آرام و مشاهده‌گرند و تغییرات ناگهانی (جابه‌جایی قفس، آدم‌های جدید، اسباب‌بازی ناآشنا) را دوست ندارند. سکوت طولانی یا بی‌حرکتی‌شان همیشه نشانه‌ی بیماری نیست — ولی اگر رفتار «عادی» پرنده‌ی شما تغییر کرد، جدی بگیرید.

	نر	ماده
شخصیت معمول	اغلب آرام‌تر، پذیراتر و خوش‌برخوردتر با چند عضو خانواده	اغلب مسلط‌تر، مستقل‌تر و سرزمینی؛ به‌ویژه در فصل تولیدمثل
رفتار هورمونی	برگرداندن غذا، دنبال‌کردن یک نفر	دفاع از قفس یا «لانه»، گشتن دنبال کمد و جای تاریک، تخم‌گذاری حتی بدون نر
نکته	این‌ها گرایش کلی‌اند، نه قانون؛ تربیت و محیط نقش بزرگ‌تری دارند.	

- **زبان بدن:** تنگ و گشادشدن مردمک، پرهای پف‌کرده‌ی سر و گردن و بدن خشک و جلو آمده = هیجان یا هشدار؛ سائیدن منقار هنگام استراحت = آرامش. پف مداوم با چشم نیمه‌بسته = احتمال بیماری.
- **آموزش:** «بالا»، «پایین»، برگشتن داوطلبانه به قفس و آموزش با تارگت؛ جلسه‌های کوتاه ۵ تا ۱۰ دقیقه‌ای با تکه‌ی کوچک میوه به‌عنوان پاداش.
- **اعتمادسازی:** با سرعت پرنده پیش بروید؛ بیشتر اکلکتوس‌ها نوازش سر را می‌پذیرند ولی لمس بدن را نه. نوازش پشت و زیر بال رفتار جفتی را تحریک می‌کند.
- **ماده‌ی هورمونی:** خواب کافی، حذف لانه‌های احتمالی، تغییر چیدمان قفس و پرهیز از غذای گرم و نرم زیاد کمک می‌کند. تخم‌گذاری مکرر را با دامپزشک مطرح کنید.
- **چیدن بال:** تصمیمی است که با دامپزشک گرفته می‌شود؛ اکلکتوس بدن سنگینی دارد و چیدن نادرست خطر سقوط و آسیب جناغ و منقار دارد.

۷. مشکلات شایع سلامت و نشانه‌های هشدار

پرندگان بیماری را پنهان می‌کنند؛ این جدول برای شناخت زودهنگام است — تشخیص و درمان هر مورد کار دامپزشک پرندگان است.

مشکل	نشانه‌های هشدار	نکته‌ی پیشگیری
مشکلات مرتبط با تغذیه (کمبود یا زیاده‌روی)	ضربه‌زدن یا لرزش انگشتان، تکان‌دادن ناگهانی بال، پر کدر و شکننده، خطوط استرس روی پر، تغییر رنگ پر	رژیم پرتازه و متنوع؛ بدون مکمل خودسرانه؛ تغییر رژیم فقط تدریجی

کمبود ویتامین A (در رژیم تخمه‌محور)	ترشح یا گرفتگی بینی، عطسه، تورم اطراف چشم، پلاک سفید در دهان، زخم کف پا	منابع طبیعی بتاکاروتن (سبزی‌های نارنجی و سبز تیره)
کندن یا جویدن پر	پر جویده روی سینه، پا یا بال؛ گاهی پوست زخمی	اول رد علت پزشکی و تغذیه‌ای توسط دامپزشک؛ بعد اصلاح محیط، رطوبت، خواب و غنی‌سازی
تخم‌گذاری مزمن، گیرکردن تخم و کمبود کلسیم (ماده‌ها)	تخم‌گذاری پی‌درپی، زورزدن، نشستن کف قفس، دم‌جنباندن، لرزش یا ضعف	کنترل محرک‌های هورمونی و رژیم مناسب؛ گیرکردن تخم **اورژانسی** است
بیماری‌های ویروسی (PBFD، پولیوماویروس)	پر جدید بدشکل یا خونی، ناهنجاری منقار؛ در جوجه‌ها ضعف و مرگ ناگهانی	پرورش‌دهنده‌ی سالم، قرنطینه، آزمایش‌های توصیه‌شده
بیماری تنفسی و آسپرژیلوزیس	تغییر صدا، دم‌جنباندن با هر نفس، نفس با دهان باز، ترشح بینی	تهویه، غذای تازه‌ی بدون کپک، جوانه‌ی بهداشتی، پرهیز از دود و اسپری
عفونت مخمری و باکتریایی گوارش	برگرداندن غذا، بوی بد دهان، مدفوع غیرعادی، کاهش وزن	شستشوی روزانه‌ی ظرف‌ها، جمع‌کردن غذای تازه، جوانه‌ی سالم
مسمومیت با فلزات سنگین	بی‌حالی، تشنگی و ادرار زیاد، استفراغ، لرزش یا تشنج	قفس و اسباب‌بازی استاندارد، حذف گالوانیزه و وسایل قدیمی
پسیتاکوز (کلامیدیوز)	بی‌حالی، ترشح چشم و بینی، مدفوع سبز آبکی؛ گاهی بدون علامت	قرنطینه و آزمایش؛ **قابل انتقال به انسان**

بهداشت برای انسان‌ها

پسیتاکوز می‌تواند از پرنده به انسان منتقل شود و علائمی شبیه آنفلوانزا یا ذات‌الریه ایجاد کند. بعد از تمیزکاری قفس و آماده‌کردن غذا دست بشویید، هنگام تمیزکردن گردوغبار راه نیندازید و اگر کسی در خانه علائم تنفسی پیدا کرد، به پزشک بگویید که پرنده نگه می‌دارید. افراد باردار، سالمند یا دچار ضعف ایمنی احتیاط بیشتری کنند.

۸. چه زمانی فوراً به دامپزشک اگزوتیک مراجعه کنیم؟

اورژانس — همان روز مراجعه کنید

- تنفس با دهان باز، دم‌جنباندن شدید، صدای خس‌خس
- نشستن کف قفس، پف شدید و چشم‌های بسته، ناتوانی در گرفتن نشیمن
- ماده‌ای که زور می‌زند و تخم نمی‌گذارد، یا بیرون‌زدگی بافت از مخرج
- خونریزی (پر خونی شکسته، منقار یا ناخن)
- تشنج، لرزش شدید، عدم تعادل؛ یا شروع ناگهانی و شدید لرزش انگشتان و تکان بال
- استفراغ مکرر، اسهال شدید یا خون در مدفوع
- خوردن احتمالی فلز، سم، دارو یا استنشاق بخار تفلون و دود
- سقوط، ضربه یا گازگرفتگی توسط سگ یا گربه — حتی بدون زخم آشکار
- نخوردن غذا یا نبود مدفوع بیش از حدود یک روز

تا رسیدن به دامپزشک: پرنده را در جعبه‌ی حمل یا قفس کوچک، گرم (نه داغ)، نیمه‌تاریک و آرام نگه دارید؛ نشیمن را پایین بگذارید. نمونه‌ی تازه‌ی مدفوع، فهرست دقیق غذاها و هر مکملی که داده‌اید را همراه ببرید.

کارهایی که نباید انجام دهید: داروی انسانی یا مکمل «توصیه‌شده در اینترنت» ندهید، به زور آب یا غذا در منقار نریزید، پرنده‌ی بی‌حال را حمام نکنید و منتظر «خودش خوب می‌شود» نمانید.

۹. چک‌لیست خرید و انتخاب اکلکتوس سالم

خود پرنده

- ☐ چشم‌های روشن و تمیز، بدون ترشح و تورم
- ☐ سوراخ‌های بینی تمیز و قرینه
- ☐ منقار صاف و قرینه؛ رنگ منقار متناسب با جنس
- ☐ پرهای براق و کامل؛ بدون پر جویده، بدشکل یا خطوط استرس زیاد
- ☐ بدون لرزش انگشتان یا تکان‌های غیرعادی بال
- ☐ مخرج تمیز، بدون مدفوع چسبیده
- ☐ هوشیار، با غذاخوردن مستقل
- ☐ تنفس آرام، بدون جنبیدن دم
- ☐ پاها و انگشتان سالم، گرفتن محکم نشیمن

فروشنده و مدارک

- ☐ پرورش‌دهنده‌ی شناخته‌شده؛ نه پرنده‌ی بدون مبدأ
- ☐ پلاک بسته یا میکروچیپ و مدارک قانونی (CITES/مجوزها)
- ☐ زیرگونه، سن و **رژیم فعلی پرنده**، مکتوب
- ☐ جوجه‌ی کاملاً از شیر گرفته‌شده
- ☐ سابقه‌ی آزمایش‌ها در صورت وجود
- ☐ آمادگی برای معاینه‌ی پیش از خرید توسط دامپزشک شما
- ☐ هیچ فشاری برای خرید فوری

قرنطینه

پرنده‌ی جدید را حدود ۳۰ تا ۴۵ روز (یا طبق نظر دامپزشک) جدا از پرندگان دیگر نگه دارید و ابتدا معاینه کنید.

۱۰. پرسش‌های متداول

نر بگیرم یا ماده؟

نرها معمولاً آرام‌تر و برای اولین تجربه‌ی اکلکتوس ساده‌ترند؛ ماده‌ها اغلب مستقل‌تر و پرشخصیت‌ترند ولی ممکن است در فصل تولیدمثل سرزمینی شوند و تخم بگذارند. فرد پرنده و تربیتش از جنس مهم‌تر است.

آیا اکلکتوس حرف می‌زند؟

بسیاری از اکلکتوس‌ها کلمات و جمله‌های کوتاه را با وضوح خوبی تقلید می‌کنند، اما تضمینی نیست. پرنده را برای حرف‌زدن نخرید.

چرا اکلکتوس من گاهی پاهایش را «ضرب» می‌گیرد یا بال‌هایش را تکان می‌دهد؟

این رفتارها در اکلکتوس‌ها شناخته‌شده‌اند و اغلب به رژیم (از جمله مکمل‌ها یا تغییر ناگهانی غذا) نسبت داده می‌شوند، اما علت دیگری هم ممکن است داشته باشند. خودتان رژیم را عوض نکنید؛ با دامپزشک پرندگان بررسی کنید.

می‌توانم فقط پلت بدهم چون «کامل» است؟

برای اکلکتوس معمولاً نه. این گونه به غذای تازه‌ی زیاد نیاز دارد و رژیم تمام‌پلت یا پلت به‌علاوه‌ی مکمل برای برخی اکلکتوس‌ها مشکل‌ساز گزارش شده است.

اکلکتوس من ساعت‌ها ساکت روی نشیمن می‌نشیند؛ مریض است؟

اکلکتوس‌ها ذاتاً آرام‌اند. ملاک، تغییر نسبت به رفتار معمول خود پرنده است: پف مداوم، خواب روزانه‌ی زیاد، کم‌اشتهایی یا تغییر مدفوع را جدی بگیرید.

۱۱. هشدار پایانی

این راهنما برای آموزش صاحبان پرنده تهیه شده و **جایگزین معاینه، تشخیص و درمان توسط دامپزشک نیست**. هیچ دارو یا دوزی در آن ذکر نشده است و نباید خودسرانه به پرنده دارو یا مکمل داد. اعداد ذکرشده (دما، ابعاد، سهم غذاها، طول عمر) محدوده‌های رایج‌اند و بسته به زیرگونه، فرد و منبع متفاوت‌اند. در هر تردید، با یک دامپزشک پرندگان و حیوانات اگزوتیک مشورت کنید.

مطالعه‌ی بیشتر (تغذیه‌ی طوطی‌سانان، کمبود ویتامین A، کندن پر، تخم‌گذاری مزمن، پسیتاکوز و نشانه‌های بیماری): exoticsbymahdiyar.ir/articles