راهنمای نگهداری · خزندگان

گکوی پلنگی (لئوپارد گکو)

Eublepharis macularius

محبوب‌ترین خزنده‌ی مبتدی‌پسند دنیا: آرام، کوچک و کم‌توقع — به شرط اینکه گرمای زیر شکم، سه پناهگاه، حشرات درست و مکمل کلسیم و ویتامین را جدی بگیرید.

دکتر مهدیار رمزگویان · دامپزشک حیوانات اگزوتیک



Photo: Christian von Faber-Castell, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

۱. کارت اطلاعات سریع

نام فارسی / علمی	گکوی پلنگی، لئوپارد گکو — *Eublepharis macularius*
زیستگاه طبیعی	مناطق خشک و سنگلاخی افغانستان، پاکستان، شمال‌غرب هند و شرق ایران
طول عمر	معمولاً ۱۵ تا ۲۰ سال با نگهداری خوب (گاهی بیشتر)
اندازه‌ی بالغ	حدود ۱۸ تا ۲۵ سانتی‌متر از سر تا نوک دم؛ وزن معمولاً ۴۵ تا ۸۰ گرم (برخی لاین‌های «جاینت» سنگین‌تر)
سطح دشواری	آسان تا متوسط — مناسب مبتدی، به شرط تجهیزات درست از روز اول
رژیم غذایی	کاملاً حشره‌خوار (میوه و سبزی نمی‌خورد)
دما	سطح نقطه‌ی گرم ۳۰ تا ۳۴°C؛ سمت خنک ۲۲ تا ۲۶°C؛ شب تا حدود ۲۰°C قابل‌قبول
رطوبت	محیط کلی ۳۰ تا ۴۰٪؛ داخل پناهگاه مرطوب بالاتر (حدود ۷۰ تا ۸۰٪)
نور	چرخه‌ی روز و شب منظم (حدود ۱۲ ساعت)؛ UVB کم‌شدت مفید و توصیه‌شده است
فعالیت	شب‌گرد و فعال در گرگ‌ومیش؛ روزها بیشتر در پناهگاه
اجتماعی / تنها	تنهازی؛ نگهداری انفرادی بهترین انتخاب است — هرگز دو نر با هم

۲. مناسب چه کسی است؟ آیا انتخاب درستی است؟

گکوی پلنگی به دلیل جثه‌ی کوچک، رفتار آرام و نیازهای نسبتاً ساده، معمولاً بهترین «اولین خزنده» است. اما «ساده» یعنی «بی‌نیاز» نیست؛ بیشتر بیماری‌هایی که در مطب می‌بینیم از اشتباه‌های ساده‌ی تجهیزاتی و تغذیه‌ای می‌آیند.

انتخاب مناسبی است اگر...

- حیوانی آرام می‌خواهید که بیشتر تماشایی است تا بازیگوش.
- برنامه‌ی کاری‌تان شلوغ است؛ بالغ‌ها هفته‌ای چند بار غذا می‌خورند.
- با نگهداری و خرید منظم حشره‌ی زنده (یا پرورش آن) مشکلی ندارید.
- برای تعهد ۱۵ سال و بیشتر آماده‌اید.

بهتر است صبر کنید اگر...

- حیوانی برای بغل‌کردن طولانی و بازی روزانه می‌خواهید.
- نمی‌توانید ترموستات و دماسنج دیجیتال بخرید.
- کودک کوچک بدون نظارت بزرگ‌تر قرار است مسئول آن باشد.
- در خانه دسترسی به دامپزشک آشنا با خزندگان ندارید.

نکته‌ی قانونی و اخلاقی

گکوی پلنگی بومی شرق ایران هم هست و گونه‌ی نزدیکش (*E. angramainyu*) در غرب و جنوب‌غرب کشور زندگی می‌کند. فقط حیوان **پرورش‌یافته در اسارت** از پرورش‌دهنده‌ی معتبر بخرید؛ صید از طبیعت هم به جمعیت وحشی آسیب می‌زند و هم حیوانِ صیدشده معمولاً پرانگل‌تر و پراسترس‌تر است. هرگز گکوی خانگی را در طبیعت رها نکنید — خطر انتقال بیماری و آلودگی ژنتیکی جمعیت بومی جدی است.

۳. محل نگهداری و تجهیزات

اندازه‌ی محفظه

یک تراریوم ۲۰ گالنی بلند (حدود ۷۵×۳۰×۳۰ سانتی‌متر) **حداقلِ مطلق** برای یک گکوی بالغ است. توصیه‌ی امروزی فضای بزرگ‌تر است — مثلاً ۹۰×۴۵×۴۵ سانتی‌متر یا بیشتر — چون طول بیشتر یعنی گرادیان حرارتی واقعی‌تر و فضای بیشتر برای جست‌وجو و رفتار طبیعی. تراریوم با درِ جلوبازشو، تهویه‌ی مناسب و درپوش توری محکم بهترین انتخاب است.

گرادیان حرارتی — مهم‌ترین بخش

خزنده‌ها دمای بدنشان را خودشان تولید نمی‌کنند؛ گوارش، ایمنی و حتی اشتها مستقیم به دما وابسته است. گکو باید بتواند بین گرم و خنک جابه‌جا شود.

منطقه	دمای هدف	چطور؟
سطح نقطه‌ی گرم (زیر پناهگاه گرم)	۳۰ تا ۳۴°C	پد حرارتی زیر یک‌سوم کف، یا لامپ حرارتی/پنل سقفی؛ **همیشه با ترموستات**
هوای سمت گرم	حدود ۲۷ تا ۳۰°C	با دماسنج دیجیتال پروب‌دار اندازه بگیرید
سمت خنک	۲۲ تا ۲۶°C	بدون منبع گرما
شب	تا حدود ۲۰°C افت قابل‌قبول است	چراغ روشن‌کننده خاموش؛ اگر خانه سردتر است گرمای بدون نور (پد یا پنل) با ترموستات

هشدار سوختگی

پد حرارتی بدون ترموستات می‌تواند به دماهای بسیار بالا برسد و گکو — که گرما را از شکم می‌گیرد — ممکن است دیر متوجه شود. سنگ حرارتی (هیت‌راک) را کنار بگذارید. دماسنج عقربه‌ای چسبی دقیق نیست؛ از دماسنج دیجیتال یا ترمومتر لیزری استفاده کنید. در قطعی‌های برق، از قبل برنامه‌ی جایگزین گرمایی داشته باشید.

نور و UVB

گکوی پلنگی شب‌گرد است و می‌تواند ویتامین D3 را از مکمل غذایی بگیرد، اما شواهد و تجربه‌ی بالینی نشان می‌دهد **UVB کم‌شدت** (لامپ‌های ۵ تا ۷ درصد یا مدل‌های مخصوص گونه‌های سایه‌دوست) برای سلامت عمومی و رفتار مفید است. لامپ را در سمت گرم نصب کنید تا حیوان بتواند داخل پناهگاه از آن دور شود. لامپ‌های UVB حتی وقتی هنوز روشن‌اند، با گذشت زمان افت می‌کنند؛ طبق توصیه‌ی سازنده (معمولاً هر ۶ تا ۱۲ ماه) تعویضشان کنید. چرخه‌ی روز و شب را با تایمر منظم کنید و شب‌ها نور رنگی (قرمز/آبی) روشن نگذارید.

بستر

- **امن و ساده:** دستمال کاغذی (به‌خصوص در قرنطینه و برای جوان‌ها)، کاشی یا سنگ صاف، کاغذ بدون جوهر.
- **طبیعی (برای باتجربه‌ها):** مخلوط خاک و ماسه‌ی بدون مواد افزودنی، به‌صورت بیواکتیو و با سطح کمی سفت.
- **پرهیز کنید:** «شن کلسیمی»، پوسته‌ی گردو، تراشه‌ی چوب کاج/سدر، و شن ریز شل برای گکوی جوان یا حیوانی که کمبود کلسیم دارد — خطر بلع و انسداد گوارشی. فرش خزنده هم ممکن است ناخن‌ها را گیر بیندازد و تمیزکردنش سخت است.

سه پناهگاه، نه یکی

- **پناهگاه گرم:** روی نقطه‌ی گرم — محل گوارش غذا.
- **پناهگاه خنک:** در سمت خنک — برای تنظیم دما بدون اینکه مجبور شود بین «امنیت» و «دمای مناسب» یکی را انتخاب کند.
- **پناهگاه مرطوب:** جعبه‌ای با خزه‌ی اسفاگنوم یا حوله‌ی کاغذی نم‌دار، معمولاً نزدیک سمت گرم؛ کلید پوست‌اندازی کامل، به‌خصوص پوست دور انگشت‌ها و نوک دم.

یک ظرف آب کم‌عمق و تمیز همیشه لازم است. شاخه‌ی پهن، سنگ‌های محکم (بدون احتمال ریزش) و گیاه مصنوعی یا زنده‌ی بی‌خطر، محیط را برای جست‌وجو غنی می‌کنند.

۴. تغذیه

گکوی پلنگی کاملاً حشره‌خوار است و میوه، سبزی یا غذای خشک حیوانات را هضم و استفاده نمی‌کند. اندازه‌ی طعمه نباید از فاصله‌ی بین دو چشم گکو بزرگ‌تر باشد.

سن	دفعات غذادهی (راهنمای کلی)	مقدار
جوجه و جوان (تا حدود ۶ ماه)	روزانه یا تقریباً هر روز	هر چقدر در ۱۰ تا ۱۵ دقیقه می‌خورد
نیمه‌بالغ (۶ تا ۱۲ ماه)	یک روز در میان	بسته به وزن و دم
بالغ (بالای حدود ۱ سال)	۲ تا ۳ بار در هفته	معمولاً چند حشره‌ی مناسب در هر وعده؛ بر اساس وضعیت دم تنظیم کنید

چه بدهیم؟

- **پایه:** جیرجیرک، سوسک دوبیا، لارو مگس سرباز سیاه (کلسیم بالاتر).
- **متنوع‌کننده:** کرم ابریشم، کرم آردی (معتدل).
- **گاه‌به‌گاه برای بالغ:** سوپرورم.
- **فقط تشویقی و کم:** کرم مومی (پرچرب و اعتیادآور).

چه ندهیم؟

- حشرات صیدشده از حیاط و پارک (سم و انگل).
- کرم شب‌تاب — سمی است.
- میوه، سبزی، غذای گربه/سگ.
- بچه‌موش (پینکی) — چرب و غیرضروری.
- حشره‌ی بزرگ‌تر از فاصله‌ی دو چشم.

گات‌لود و مکمل — چرا مهم است؟

حشره‌ها به‌تنهایی نسبت کلسیم به فسفر نامناسبی دارند و ویتامین کافی ندارند. برای همین:

- **گات‌لود:** ۲۴ تا ۴۸ ساعت پیش از غذادهی به حشرات غذای مغذی (سبزی برگی، هویج، غذای مخصوص گات‌لود) بدهید؛ «حشره‌ی گرسنه» غذای توخالی است.
- **کلسیم:** حشرات را در بیشتر وعده‌ها (به‌ویژه برای جوان‌ها و ماده‌های در سن تخم‌گذاری) با پودر کلسیم پودری کنید. اینکه پودر کلسیم با D3 باشد یا بدون آن، به وجود یا نبود UVB بستگی دارد؛ این را با دامپزشکتان هماهنگ کنید.
- **مولتی‌ویتامین:** معمولاً هفته‌ای یک‌بار. گکوی پلنگی بتاکاروتن را به‌خوبی به ویتامین A تبدیل نمی‌کند؛ پس مولتی‌ویتامینی انتخاب کنید که **ویتامین A آماده** (رتینول) داشته باشد، نه فقط بتاکاروتن.
- **آب:** ظرف آب تازه همیشه در دسترس باشد و روزانه عوض شود.

دم، دفترچه‌ی سلامت گکوست

دم گکوی پلنگی محل ذخیره‌ی چربی است. دمی که پهنای آن تقریباً به اندازه‌ی گردن است نشانه‌ی وضعیت خوب است. دم باریک و استخوانی یعنی کم‌غذایی یا بیماری؛ اما دمی که از بدن پهن‌تر شده و «چربی زیر بغل» (برآمدگی پشت دست‌ها) هم دیده می‌شود، یعنی چاقی و خطر کبد چرب. ماهانه با ترازوی آشپزخانه (گرمی) وزن کنید.

۵. برنامه‌ی مراقبت

روزانه

- ☐ بررسی دما با دماسنج دیجیتال (سمت گرم و خنک)
- ☐ تعویض آب ظرف و تمیزکردن ظرف
- ☐ جمع‌کردن مدفوع (گکو معمولاً یک گوشه‌ی ثابت دارد)
- ☐ غذادهی طبق سن؛ برداشتن حشرات خورده‌نشده
- ☐ نگاه کوتاه: چشم‌ها باز و شفاف؟ رفتار طبیعی؟

ماهانه

- ☐ وزن‌کشی و ثبت در دفترچه
- ☐ تمیزکردن کامل تراریوم با ضدعفونی‌کننده‌ی بی‌خطر برای خزنده و آبکشی کامل
- ☐ بررسی سیم‌کشی، ترموستات و پد حرارتی
- ☐ تعویض بستر کاغذی (یا بخشی از بستر طبیعی)

هفتگی

- ☐ مرطوب‌کردن دوباره‌ی بستر پناهگاه مرطوب
- ☐ تمیزکردن نقطه‌ای بستر و دکور
- ☐ مولتی‌ویتامین (طبق برنامه)
- ☐ بررسی انگشت‌ها و نوک دم برای پوست باقیمانده

سالانه

- ☐ معاینه‌ی سالانه نزد دامپزشک اگزوتیک + آزمایش مدفوع برای انگل
- ☐ تعویض لامپ UVB طبق توصیه‌ی سازنده
- ☐ بازبینی رژیم و مکمل‌ها با دامپزشک

بهداشت و سالمونلا

مانند همه‌ی خزندگان، گکوی پلنگی می‌تواند بدون هیچ علامتی ناقل سالمونلا باشد. پس از هر تماس با حیوان، تجهیزات یا آب تراریوم دست‌ها را با آب و صابون بشویید؛ ظرف‌ها را در سینک آشپزخانه نشویید؛ کودکان زیر ۵ سال، زنان باردار، سالمندان و افراد دچار نقص ایمنی تماس مستقیم نداشته باشند یا با احتیاط بیشتر رفتار کنند.

۶. رفتار، دست‌آموزی و هندلینگ

گکوی پلنگی پلک متحرک دارد (برخلاف بیشتر گکوها)، روی شیشه بالا نمی‌رود و معمولاً گاز نمی‌گیرد. با صبر، بیشتر آن‌ها هندلینگ کوتاه را به‌خوبی تحمل می‌کنند.

رفتار	معمولاً یعنی…
تکان‌دادن آرام و موجی دم	هیجان یا تمرکز روی طعمه؛ در نرها گاهی رفتار جفت‌یابی
لرزش سریع و تیز دم	تحریک یا اخطار — مخصوصاً وقتی گکوی دیگری را می‌بیند
بالا بردن دم و قوس دادن بدن، جیغ یا صدای خش‌خش	ترس و حالت دفاعی؛ رهایش کنید
لیس‌زدن محیط یا دست شما	جست‌وجوی بویایی؛ طبیعی است
رنگ کدر و سفید، پنهان‌شدن بیشتر	نزدیک پوست‌اندازی؛ طبیعی است و معمولاً پوست را می‌خورد
بی‌حالی در روز	طبیعی (شب‌گرد است)؛ اما بی‌حالی شبانه + کم‌اشتهایی طبیعی نیست

روش درست هندلینگ

- ۵ تا ۷ روز اول پس از ورود کاری به او نداشته باشید؛ فقط غذا و آب. اگر حیوان دیگری هم دارید، دوره‌ی قرنطینه‌ی جداگانه را رعایت کنید.
- از کنار و پایین نزدیک شوید، نه از بالا (حرکت از بالا شبیه شکارچی است). کف دست را جلویش بگذارید تا خودش بالا بیاید.
- هرگز از دم نگیرید و دم را نکشید؛ گکو در دفاع دمش را می‌اندازد. دم دوباره رشد می‌کند اما شکل اولیه را نمی‌گیرد و ذخیره‌ی چربی هم از دست می‌رود.
- جلسه‌ها را کوتاه (۵ تا ۱۵ دقیقه) و نزدیک زمین نگه دارید؛ سقوط از ارتفاع خطرناک است.
- بلافاصله بعد از غذا و در دوره‌ی پوست‌اندازی هندلینگ نکنید.

نگهداری گروهی توصیه نمی‌شود: دو نر با هم دعوای جدی می‌کنند و نگهداری نر و ماده با هم به تخم‌گذاری مکرر و فرسودگی ماده می‌انجامد. حتی ماده‌ها کنار هم ممکن است رقابت غذایی و استرس پنهان داشته باشند.

۷. مشکلات شایع سلامت و نشانه‌های هشدار

مشکل	نشانه‌ها	علت رایج / پیشگیری
بیماری متابولیک استخوان (MBD)	پاهای کج یا متورم، فک نرم و «لاستیکی»، لرزش، راه‌رفتن روی شکم، شکستگی	کمبود کلسیم/D3، مکمل نامنظم؛ با مکمل درست و UVB کم‌شدت پیشگیری کنید
پوست‌اندازی ناقص	حلقه‌ی پوست دور انگشت یا نوک دم، تیره‌شدن یا افتادن انگشت	نبود پناهگاه مرطوب، کم‌آبی؛ پوست مانده را هرگز به‌زور نکنید
کمبود ویتامین A	پلک‌های متورم و بسته، پوست‌اندازی بد، مشکل همی‌پنیس در نرها	مولتی‌ویتامین بدون ویتامین A آماده؛ تشخیص با دامپزشک
کریپتوسپوریدیوز	لاغری پیشرونده و «دم چوبی» با وجود غذاخوردن، بازگرداندن غذا، اسهال	انگل تک‌یاخته‌ای مسری؛ قرنطینه‌ی جدی، آزمایش مدفوع، بهداشت
انسداد گوارشی	شکم برآمده، نبود مدفوع چندروزه، بی‌اشتهایی، گاهی لکه‌ی تیره زیر پوست شکم	بستر شل + دمای پایین + کم‌آبی؛ بستر امن و گرمای درست
چاقی و کبد چرب	دم پهن‌تر از بدن، برآمدگی چربی پشت دست‌ها، بی‌حالی، گاهی کم‌اشتهایی ناگهانی	کرم مومی و سوپرورم زیاد، غذادهی روزانه در بالغ
مشکلات تولیدمثلی ماده‌ها	شکم بزرگ، زورزدن بی‌نتیجه، بی‌حالی، بی‌اشتهایی طولانی (تخم‌ماندگی یا فولیکول‌ماندگی)	ماده‌ها حتی بدون نر هم ممکن است تخمک بسازند؛ ظرف تخم‌گذاری مرطوب و کلسیم کافی
عفونت دهان و تنفس	بزاق کف‌آلود، تورم یا قرمزی لثه، نفس‌کشیدن با دهان باز، صدای خس‌خس	دمای پایین، بهداشت ضعیف، استرس

مشکلات چشم	چشم بسته یا فرورفته، ترشح، پوست مانده زیر پلک	پوست‌اندازی ناقص، گردوغبار بستر، کمبود ویتامین A
سوختگی حرارتی	لکه‌ی قهوه‌ای یا تاول روی شکم	پد یا سنگ حرارتی بدون ترموستات

درباره‌ی برخی مورف‌ها

در بعضی مورف‌ها (مشهورترین نمونه «انیگما») مشکلات عصبی ارثی مثل چرخیدن دور خود، ناتوانی در گرفتن طعمه یا نگه‌داشتن تعادل گزارش شده است. پیش از خرید مورف‌های خاص، درباره‌ی سلامت ژنتیکی آن پرس‌وجو کنید.

داروها و دوزها را هرگز خودسرانه یا بر اساس توصیه‌ی اینترنتی/پت‌شاپ ندهید. بسیاری از داروهای رایج برای خزندگان کوچک خطرناک‌اند و تشخیص و درمان فقط کار دامپزشک اگزوتیک است.

۸. چه زمانی فوراً به دامپزشک اگزوتیک مراجعه کنیم؟

اورژانس — همان روز تماس بگیرید

- لرزش، تشنج، چرخیدن دور خود یا ناتوانی در ایستادن
- نفس‌کشیدن با دهان باز یا صدای غیرطبیعی تنفس
- زورزدن بی‌نتیجه، یا بیرون‌زدگی بافت از مقعد (کلواک)
- خون‌ریزی، زخم عمیق، شکستگی یا سوختگی
- شکم ناگهان بزرگ و سفت همراه بی‌حالی
- بی‌حالی شدید و بی‌پاسخ‌بودن

در چند روز آینده وقت بگیرید

- کاهش وزن یا باریک‌شدن دم (حتی اگر غذا می‌خورد)
- بی‌اشتهایی بیش از ۱ تا ۲ هفته در جوان، یا بیش از چند هفته همراه کاهش وزن در بالغ
- اسهال، مدفوع بسیار بدبو یا بازگرداندن غذا
- پوست‌اندازی ناقص تکراری، یا چشم‌های بسته
- تورم اندام‌ها یا فک

تا رسیدن به دامپزشک: حیوان را در ظرف دربسته و تهویه‌دار با دستمال کاغذی بگذارید، گرمای ملایم و قابل‌کنترل (حدود دمای سمت گرم تراریوم) فراهم کنید، از دادن هر دارو یا غذا به‌زور خودداری کنید، و از دما، غذا، مکمل و مدفوع اخیر عکس یا یادداشت ببرید. اگر عضوی از دم جدا شده، فقط محیط را تمیز و بستر را کاغذی نگه دارید.

۹. چک‌لیست خرید و انتخاب گکوی سالم

خود حیوان

- ☐ پرورش‌یافته در اسارت، از پرورش‌دهنده‌ی شناخته‌شده (نه صیدشده)
- ☐ دم پر و گوشتی؛ استخوان لگن و دنده‌ها برجسته نیستند
- ☐ چشم‌ها باز، شفاف و بدون ترشح
- ☐ بدون پوست باقیمانده روی انگشت‌ها و نوک دم؛ همه‌ی انگشت‌ها سالم

پیش از آمدن به خانه

- ☐ تراریوم با درِ امن، آماده و دماها از چند روز قبل تنظیم‌شده
- ☐ ترموستات + دماسنج دیجیتال
- ☐ پد حرارتی یا منبع گرمای سقفی
- ☐ لامپ UVB کم‌شدت و تایمر
- ☐ سه پناهگاه (گرم، خنک، مرطوب)

- ☐ دهان و فک قرینه، بینی تمیز
- ☐ اطراف مقعد تمیز و بدون مدفوع چسبیده
- ☐ هوشیار؛ هنگام لمس واکنش نشان می‌دهد
- ☐ جلوی شما حشره می‌خورد (یا فروشنده سابقه‌ی غذاخوردنش را دارد)
- ☐ ترجیحاً بالای ۳ ماه و حداقل حدود ۱۵ تا ۲۰ گرم
- ☐ ظرف آب کم‌عمق و ظرف حشره
- ☐ پودر کلسیم و مولتی‌ویتامین مناسب خزندگان
- ☐ منبع منظم حشره و ظرف گات‌لود
- ☐ ترازوی گرمی
- ☐ شماره‌ی یک دامپزشک اگزوتیک

۱۰. پرسش‌های متداول

آیا واقعاً به لامپ UVB نیاز دارد؟

گکوی پلنگی می‌تواند با مکمل D3 زنده بماند و برای همین سال‌ها بدون UVB نگهداری می‌شد. اما UVB کم‌شدت، اگر درست نصب شود و حیوان بتواند از آن فاصله بگیرد، فایده دارد و توصیه‌ی امروزی است. تنظیم نوع مکمل کلسیم را هم بر همین اساس با دامپزشک هماهنگ کنید.

گکوی من در زمستان کم‌غذا شده؛ طبیعی است؟

بسیاری از بالغ‌ها — به‌ویژه نرها — در ماه‌های سرد یا فصل جفت‌گیری کم‌اشتها می‌شوند. اگر دماها درست است، وزن و دم ثابت می‌ماند و رفتار عادی است، معمولاً جای نگرانی نیست. کاهش وزن، باریک‌شدن دم یا بی‌اشتهایی در گکوی جوان طبیعی نیست.

می‌توانم دو گکو را در یک تراریوم نگه دارم؟

توصیه نمی‌شود. گکوی پلنگی تنهازی است و از هم‌خانه «لذت» نمی‌برد. دو نر دعوا می‌کنند، نر و ماده به تخم‌گذاری مکرر و فرسایش ماده می‌رسند و حتی دو ماده ممکن است استرس و رقابت غذایی پنهان داشته باشند.

دم گکو افتاد؛ چه کنم؟

آرام بمانید؛ این یک مکانیزم دفاعی است و معمولاً خون‌ریزی کمی دارد. بستر را به دستمال کاغذی تغییر دهید، محیط را تمیز نگه دارید و غذادهی را ادامه دهید. اگر خون‌ریزی ادامه داشت، تورم یا ترشح دیدید یا حیوان بی‌اشتها شد، به دامپزشک مراجعه کنید.

رنگش سفید و کدر شده و پوستش را خورد؛ بیمار است؟

نه، این پوست‌اندازی است. جوان‌ها تقریباً هر یکی دو هفته و بالغ‌ها هر چند هفته یک‌بار پوست می‌اندازند و خوردن پوست رفتاری طبیعی است. فقط بعد از هر پوست‌اندازی انگشت‌ها و نوک دم را بررسی کنید.

شن برای گکو مناسب است؟ در عکس‌ها روی شن است.

شن ریز و شل — به‌ویژه «شن کلسیمی» — برای جوان‌ها و حیوانی که کمبود کلسیم یا دمای پایین دارد خطر بلع و انسداد دارد. مخلوط خاک و ماسه‌ی طبیعی در تراریوم بیواکتیو برای بالغ سالم با تجهیزات درست می‌تواند مناسب باشد، اما برای شروع، دستمال کاغذی یا کاشی امن‌ترین گزینه است.

هشدار پایانی: این راهنما برای آموزش صاحبان گکوی پلنگی تهیه شده و **جایگزین معاینه، تشخیص و درمان توسط دامپزشک نیست**. هیچ نام یا دوز دارویی در آن ذکر نشده است. هر گکو شرایط خاص خودش را دارد؛ در صورت بروز هر نشانه‌ی بیماری یا تردید، با دامپزشک آشنا با خزندگان مشورت کنید.

بیشتر بخوانید در exoticsbymahdiyar.ir: نگهداری گکوی لئوپارد · راه‌اندازی تراریوم · نور UVB خزندگان · ترموستات و دماسنج · پوست‌اندازی ناقص · بیماری متابولیک استخوان · کریپتوسپوریدیوز · کبد چرب · افتادن دم در گکو · برنامه‌ی قطعی برق برای خزندگان · قرنطینه‌ی حیوان جدید

دکتر مهدیار رمزگویان · ۵ آبان ۱۴۰۵ (۲۷ اکتبر ۲۰۲۶) · نسخه ۱ · exoticsbymahdiyar.ir